

SÜVAVEENTROMBOOS (SVT)

*v.iliaca communis,
v.femoralis communis,
v.femoralis profunda,
v.femoralis superficialis,
v.poplitea,
v.tibialis anterior et
posterior,
v.peronealis*

KLIIINILINE KAHTLUS

UH-DOPPLER SÜVAVEENIDEST

TROMB VISUALISEERUB

Sääre osas, kui kindlat trombi ei leia
kuid kliiniliselt kahtlus püsib, vajalik
uuringut korrata 7-10 päeva pärast!

RAVI – MMH ravidosis!

Alustada kohe 1. doosiga!

Naatriumenoksapariin	100 RÜ/kg x 2 s.c. või 150 RÜ/kg x 1 s.c.
Daltepariinnaatrium	100 RÜ/kg x 2 s.c. või 200 RÜ/kg x 1 s.c.
Nadropariinkaltsium	85 RÜ/kg x 2 s.c.
Naatriumbemipariin	115 RÜ/kg x 1 s.c.

**NB! Paralleelselt alustada varfariinnaatriumiga
doosis 6-9 mg/die**

või

Rivaroksabaan	15mg x 2 esimesed 21 päeva, edasi 20mg x 1
---------------	---

Dgn.kood: **I 80-I 82**
Madalmolekulaarse
hepariini (MMH)
soodustus 100%
sissejuhatavaks raviks
kuni 10 päeva

Esimesel võimalusel
PEREARST või
TROMBOOSIKABINET

v.saphena magna
v.saphena parva

PINDMINE VEENITROMBOOS (PVT)

KLIINILINE KAHTLUS

UH-DOPPLER PINDMISTEST JA SÜVAVEENIDEST

PINDMISTE VEENIDE TROMBOOS

Kriteeriumid:

- Tromb >5 cm
- Ülalpool põlve
- V.saphena magna
- Hiljutine kirurgia
- Kasvaja anamneesis
- Eelnev PVT või SVT

Kriteeriumitele ei vasta

Lokaalne ravi hepariin geeliga
Suu kaudu või lokaalselt NSAID

RAVI – MMH profülaktilises doosis!

Alustada koheselt 1. doosiga!

Naatriumenoksapariin	4000 RÜ x 1 s.c.
Naatriumbemipariin	3500 RÜ x 1 s.c.
Daltepariinnaatrium	5000 RÜ x 1 s.c.
Nadropariinkaltsium	3850 RÜ x 1 s.c.
Fondapariinuksnaatrium	2,5 mg x 1 s.c.

Ravi kestvus kuni 45 päeva

ITK tromboosikabinet

Visiidi aja kokkuleppimiseks
helistada kl. 08:00-10:00 või
saata e-kiri.

Õde OKSANA BEBIH:

tel. 620 7991
oksana.bebih@itk.ee

Õde AIRE PÖDER:

tel. 620 7968
aire.poder@itk.ee

Esimesel võimalusel

PEREARST või
TROMBOOSIKABINET

Juhise koostas:



Väljaandmist toetas:

