

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Hjertemagnyl 75, 75 mg / 10,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Hjertemagnyl 75 täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Hjertemagnyl 75 ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Hjertemagnyl 75 kasutamist
3. Kuidas Hjertemagnyl 75 tablette kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Hjertemagnyl 75 tablette säilitada.
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON HJERTEMAGNYL 75 JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Hjertemagnyl 75 on tromboosivastane ravim, mida kasutatakse tromboosi profülaktikaks (ennetamiseks) südame isheemiatõve, müokardiinfarkti või ajuinfarkti korral ja pärast südame pärgarterite operatsioone..

Kui Teie arst on määranud selle ravimi mõne muu näidustuse puhul, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE HJERTEMAGNYL 75 TABLETTIDE KASUTAMIST

Ärge võtke Hjertemagnyl 75 tablette:

- kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe või Hjertemagnyl 75 mõne koostisosa suhtes;
- kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon, nagu nt astma, vesine nina või sügelev nahalööve peale atsetüülsalitsüülhappet sisaldava ravimi manustamist (nt aspiriin) või teistele valu ja põletikku leevendavatele ravimitele (MSPVA`d);
- kui teil on olnud hiljuti veritsus seedetraktist;
- kui teil on mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi;
- kui teil on olnud hiljuti ajuverejooks;
- kui teil on trombotsüütide vähesus veres (trombotsütopeenia) või kalduvus veritsuse tekkeks;
- kui teil on raske maksapuudulikkus, maksatsirroos;
- kui teil on raske neerupuudulikkus
- kui teil on raske südamepuudulikkus;
- raseduse kolmas trimester (annus >100 mg/päevas).

Kui teil esineb loetletud vastunäidustusi, pidage enne ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Hjertemagnyl 75

- kui teil on astma või allergia (asetüülsalitsüülhappe kasutamine võib vallandada astmahoo);
- kui teil on langenud maksa või neerufunktsioon;
- kui teil on ravimata kõrgvererõhutõbi;
- kui te kasutate samaaegselt antikoagulante.

Atsetüülsalitsüülhappet ei ole soovitatav lastel ja alla 15 aasta vanustel noorukitel kasutada palavikuga kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye' sündroom (kauakestev oksendamine, maksafunktsiooni häired, entsefalopaatia, kooma).

Hjertemagnyl 75 kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ravimeid.

Hjertemagnyl võib nõrgendada järgmiste ravimite toimet:

- spironolaktooni ja furosemiidi sisaldavad diureetikumid;
- kusihaape eritumist soodustavad ravimid (probenetsiid)
- AKE-ihniitorid (vererõhku langetavad ravimid). Kooskasutamisel suureneb ägeda neerupuudulikkuse oht (seda eriti olemasoleva neerukahjustasega patsiendil).

Hjertemagnyl võib tugevdada järgmiste ravimite toimet:

- vere hüübimist pärssivad ravimid (nt kumariini derivaadid, hepariin);
- suhkurtõve vastased ravimid;
- metotreksaat, mida kasutatakse keemiaraviks ja ka mõningate podagra vormide puhul.

Atsetüülsalitsüülhappe kasutamine samaaegselt koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või glükokortikosteroididega võib suurendada seedetrakti verejooksude ohtu.

Atsetüülsalitsüülhappe kasutamisel koos tetratsükliinidega võivad tekkida lahustumatud ühendid, mistõttu peaks neid ravimeid võtma 1...3 tunnise vaheajaga.

Kui te kahtlete, kas võite neid ravimeid koos kasutada, pidage nõu arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Raseduse viimasel trimestril on atsetüülsalitsüülhappe annuses üle 100 mg/ööpäevas vastunäidustatud .

Mitmes epidemioloogilises uuringus on salitsülaate kasutamist esimesel kolmel raseduskuul seostatud vääraengute (suulaelõhe, südame vääraengud) tekke suurenenud ohuga. Tavaliste terapeutiliste annuste kasutamisel on see risk väike: prospektiivses uuringus, kus osales umbes 32000 ema-lapse paari, ei ilmnunud seost vääraengute esinemissageduse suurenemisega.

Salitsülaate tohib raseduse ajal kasutada ainult pärast hoolikat riski ja kasu suhte hindamist.

Salitsülaate suurte annuste (>300 mg/päevas) kasutamine viimasel kolmel raseduskuul võib viia gestatsiooniaja pikenemiseni, arterioosjuha enneaegse sulgumiseni ja emakakontraktsioonide pärssimiseni. Nii emal kui lapsel on täheldatud suurenenud eelsoodumust verejooksu tekkeks.

Atsetüülsalitsüülhappe suurte annuste (>300mg/päevas) manustamine vahetult enne sünnitust võib põhjustada koljusiseste verevalumite teket, eriti enneaegsetel imikutel.

Imetamine

Salitsülaadid ja nende metaboliidid erituvad väikestes kogustes rinnapiima. Kuna seni ei ole täheldatud ravimi aeg-ajalt kasutamise ebasoodsat mõju lapsele, ei ole tavaliselt vaja rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, pidage alati enne ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hjertemagnyl 75 ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

3. KUIDAS HJERTEMAGNYL 75 TABLETTE KASUTADA

Kasutage Hjertemagnyl 75 tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Algannus täiskasvanutel on 2...4 tabletti ööpäevas ühe annusena. Säilitusannus pikaajalise ravi korral on 1 tablett ööpäevas.

Alla 15 aasta vanustel lastel ja noorukitel tohib ravimit kasutada ainult arsti ettekirjutusel (vt lõik „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Hjertemagnyl 75“).

Kui teil on tunne, et Hjertemagnyl 75 toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke tablett klaasitäie veega. Tablette võib neelata tervelt, vajadusel ka poolitada, närida või peenestada.

Kui te võtate Hjertemagnyl 75 tablette rohkem kui ette nähtud

Võttes ravimit suuremas annuses, kui eespool soovitatud, võib tekkida kohin kõrvus, kuulmise langus, peapööritus, peavalu ja janutunne, higistamine, rahutus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, hingeldus, veritsuskalduvus. Spetsiifilist vastumürki ei ole. Mürgistuse raviks tuleb teha maoloputus aktiveeritud söega ja vajadusel rakendada haiglaravi.

Üleannustamisnähtude korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile ravimi pakendit.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Hjertemagnyl 75 põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 10-st): vere hüübimisaja pikenemine, vereliistakute kokkukleepumise pidurdumine; kõrvetised ja rõhatised

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 100-st): peavalu, unetus, väikeste hingamisteede sulgus astmahaigetel; söögitoru, mao ja kaksteistsõrmiksoole limaskesta punetus ja pindmine haavandumine, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus; nõgestõbi, nahalööbed, hooti esinev lokaalne nahaturse.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 1000-st): varjatud veritsus, raske allergiline reaktsioon, pearinglus, uimasus, tinnitus (kõrvas või peas kuuldav lisaheli), söögitoru või mao või kaksteistsõrmiksoole haavandumine ja verejooks sealhulgas veriokse ja veriroe.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l patsiendil 1000-st): kehvveresus pikaajalise ravi puhul, veresuhkru liiga madal tase, ajusisene verejooks, annusest sõltuv pöörduv kuulmislangus ja kurtus; söögitoru või mao või kaksteistsõrmiksoole tõsine verejooks ja mulgustus; transaminaaside ja alkaalse fosfotaasi (maksa ja sapiteede funktsiooni kontrollimiseks verest määratavad ensüümid) tõus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l patsiendil 10 000-st): protrombiini (verehüübimiseks vajalik vere koostisosa) liialt madal tase suurte raviannuste puhul; vereliistakute vähesus, muutused vere valgeliblede hulgas; igemepõletik, söögitoru põletik, jämesoole kahjustused (haavandumine, kitsenemine, jämesoole põletik või põletikulise soolehaiguse ägenemine), annusest sõltuv kerge või pöörduv toksiline maksakahjustus mõnede viirusinfektsioonide ajal.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS HJERTEMAGNYL 75 TABLETTE SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Hjertemagnyl 75 tablette pärast kõrblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõrblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Hjertemagnyl 75 sisaldab

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab toimeainetena 75 mg atsetüülsalitsüülhapet ja 10,5 mg magneesiumoksiidi (magneesiumhüdroksiidina).

Abiained: kartulitärklis, magneesiumstearaat, maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, propüleenglükool, talk.

Kuidas Hjertemagnyl 75 välja näeb ja pakendi sisu

Hjertemagnyl 75 tablett on valge südamekujuline.

Pakendatud klaaspurki ja karpi.

Pakendis 30 või 100 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Nycomed SEFA AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

Telefon +372 7998100

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Nycomed SEFA

Jaama 55B

63308 Põlva

Infoleht on viimati koostöölstatud oktoobris 2009