

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Thrombo ASS 75 mg gastroresistentsed tabletid Atsetüülsalitsüülhape

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Thrombo ASS'i täpselt juhiste vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Thrombo ASS ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Thrombo ASS'i võtmist
3. Kuidas Thrombo ASS'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Thrombo ASS'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON THROMBO ASS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Thrombo ASS'i toimeaine atsetüülsalitsüülhape omab vereliistakute agregatsiooni vastaseid omadusi ning seetõttu vähendab verehüüvete (veresoonte tromboosi) tekkimise ohtu. Gastroresistentsedel tablettidel on spetsiaalne õhuke polümeerkate, mis erinevalt tavalistest katteta tablettidest, ei lahustu maos, vaid hoopis peensooles. Seega ärritavad need tabletid vähem seedetrakti kui tavalised katteta tabletid.

Thrombo ASS'i kasutatakse arteriaalse tromboosi profülaktikaks järgmistel juhtudel:

Koronaartromboosi profülaktika

- müokardiinfarkti kahtluse korral ja järgselt,
- stenokardia korral,
- pärast südame pärgarterite revaskularisatsiooni protseduuri.

Ajuarterite tromboosi profülaktika

- mööduva ajuisheemia järgselt,
- ajuinsuldi järgselt.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE THROMBO ASS'I VÕTMIST

Ärge võtke Thrombo ASS'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe, Thrombo ASS'i mõne koostisosa või salitsülaatide või teiste nendesarnaste ainete suhtes;
- kui teil esinevad mao- või soolehaavandid;
- kui teil esineb eelsoodumus verejooksudele (hemorraagiline diatees), vereliistakute vähesus (trombotsütopeenias) või hemofiilia (vere hüübimatus);
- kui teil esineb neerupuudulikkus või neerukivid (oksalaatide sisaldus uriinis);
- kui te olete raseduse viimases kolmandikus ning arst on teile määranud rohkem kui 100 mg Thrombo ASS'i ööpäevas.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Thrombo ASS

- kui teil seisab ees plaaniline kirurgiline protseduur, tuleb arvesse võtta selle ravimi tromboosivastast toimet.
- kui osutub vajalikuks teiste salitsülaatide või nn mittesteroidsete põletikuvastaste/reumavastaste ravimite (valu- ja põletikuliste protsesside vastaste ravimite) samaaegne kasutamine. Seda otsustab arst.
- kui te kasutate Thrombo ASS'i suuremates annustes paljude aastate jooksul, sest see võib põhjustada neerukahjustust.
- kui teil esineb teadaolev ülitundlikkus teiste valuvaigistite ja reumaatiliste haiguste vastaste ravimite suhtes, bronhiaalastma, hemolüütiline aneemia, seedetrakti haigused nt gastriit või maksa- ja/või neerufunktsiooni häire. Kui teil esineb mõni neist seisunditest, siis rääkige sellest arstile. Kui teil esineb pikema perioodi vältel lakkamatu oksendamine, vedelikuvaegus, teadvusehäire ja krampid, siis pöörduge otsekohe arsti poole.

Thrombo ASS on vastunäidustatud lastele ja noorukitele, kuna atsetüülsalitsüülhappe (Thrombo ASS'i toimeaine) kasutamise ajal on üksikjuhtudel esinenud Reye' sündroomi (eluohulik tüsistus, mida iseloomustab kauakestev oksendamine, dehüdratsioon e vedelikuvaegus, teadvuse häire ja krampid).

Thrombo ASS võib häirida rasestumist. Kui te kavatsete rasestuda või teil on probleeme seoses rasestumisega, siis rääkige sellest arstile.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ravi toime võib olla mõjutatud kui Thrombo ASS'i kasutatakse samaaegselt teiste ravimitega nagu:

- veretrombide teket vähendavad ravimid (nt varfariin ja teised kumariini derivaadid, hepariin, dipüridamool, sulfiinpürasoon)
- transplantatsiooni järgselt organi äratõukereaktsiooni vähendavad ravimid (tsüklosporiin, takroliimus)
- kõrge vererõhu raviks (nt diureetikumid ja AKE inhibiitorid)
- valu ja põletiku raviks (nt kortikosteroidid või põletikuvastased ravimid)
- podagra raviks (probenetsiid, sulfiinpürasoon)
- vähktõve või reumatoidartriidi raviks (metotreksaat)
- veresuhkrutaseme langetamiseks ravimid (sulfonüüluurea)

Digoksiini, barbituraatide ja liitiumi kontsentratsioon veres võib tõusta.

Pikaajalisel antatsiidide ja H₂-retseptori blokaatorite (liigse maohappe hulga raviks) kasutamisel võib olla vajalik Thrombo ASS'i annuse suurendamine.

Samaaegse tetratsükliinide rühma ravimi (kasutatakse infektsioonhaiguste raviks) kasutamisel peab manustamise vahele jääma vähemalt 1...3-tunnine vaheaeg.

Enne Thrombo ASS'i kasutamist pidage nõu oma arstiga. Thrombo ASS'i pideva kasutamise korral pidage eelnevalt nõu oma arstiga kui plaanite võtta teisi ravimeid (sh ilma retseptita müüdadavad ravimid).

Thrombo ASS'i kasutamine koos toidu ja joogiga

Thrombo ASS'i kasutamine koos alkoholiga võib suurendada seedetrakti verejooksu ohtu.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse viimase kolme kuu jooksul ei tohi Thrombo ASS'i kasutada, kuna see võib põhjustada nii emal kui vastsündinul sünnituse käigus pikaajalist verejooksu. Raseduse esimesel kuul kuul ja imetamise perioodil tohib Thrombo ASS'i kasutada ainult tungival vajadusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet mõjutavaid toimeid ei ole oodata.

Oluline teave mõningate Thrombo ASS'i koostisainete suhtes

Üks Thrombo ASS'i tablett sisaldab 45 mg laktoosmonohüdraati. Kui te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS THROMBO ASS'I VÕTTA

Gastroresistentsed tabletid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata. Thrombo ASS'i tablette ei tohi osadeks murda, kuna see kahjustab ravimi toimet.

Võtke Thrombo ASS'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Atsetüülsalitsüülhappe (ASH) annuseid 75...300 mg üks kord ööpäevas sisse võtta soovitatakse järgmistel juhtudel:

- stenokardiaga patsientidel südamelihaseinfarkti ohu vähendamiseks;
- südamelihaseinfarkti kordumise profülaktikaks;
- mööduva ajuvereringehäire ja insuldi sekundaarseks profülaktikaks.

ASH annuseid 75...300 mg üks kord ööpäevas sisse võtta soovitatakse tromboosi profülaktikaks pärast südameveresoonte kirurgilist operatsiooni, nt pärgarterite kõrvalühenduse paigaldamist.

Ravi kestuse otsustab arst.

Kui te võtate Thrombo ASS'i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise ja mürgistuse sümptomiteks on iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, peapööritus, helin kõrvus, peavalu, segasus ja hüperventilatsioon (hingeldus). Kui teil esineb mõni neist sümptomitest, palun võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui te unustate Thrombo ASS'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata, vaid manustage järgmine annus ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Thrombo ASS'i kasutamise

Enne kui lõpetate Thrombo ASS'i kasutamise, rääkige sellest arstile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Thrombo ASS põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud vastavalt nende raskusastmele ja esinemissagedusele:

- Väga sage:** esinenud rohkem kui 1-l patsiendil 10-st
Sage: esinenud rohkem kui 1-l patsiendil 100-st, kuid vähem kui 1-l patsiendil 10-st
Aeg-ajalt: esinenud rohkem kui 1-l patsiendil 1000-st, kuid vähem kui 1-l patsiendil 100-st
Harv: esinenud rohkem kui 1-l patsiendil 10000-st, kuid vähem kui 1-l patsiendil 1000-st.
Väga harv: esinenud vähem kui 1-l patsiendil 10000-st, sh üksikjuhud.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv: veritsusaja pikenedamine, trombotsütopeenid (vereliistakute arvu vähenemine veres).

Immuunsüsteemi häired:

Harv: ülitundlikkusreaktsioonid, nt õhupuudus ja nahareaktsioonid.

Kõrva ja labürindi kahjustused:

Harv: suuremate annuste sissevõtmine võib põhjustada peapööritust ja helinat kõrvus.

Hingamise, rindkere ja keskseinandi häired

Harv: astmahoo vallandumine.

Seedetrakti häired

Harv: iiveldus, oksendamise, varjatud seedetrakti veritsus, mis harvadel juhtudel võib põhjustada rauavaegust. Suuremate annuste manustamine võib põhjustada seedetrakti haavandeid, millega kaasnevad rasked verejooksud (helepunane või kohvipaksu meenutav okse, musta värvi iste).

Maksa ja sapiteede häired

Harv: suuremate annuste manustamine pikemate perioodide vältel võib põhjustada maksakahjustust.

Neerude ja kuseteede häired

Harv: suuremate annuste manustamine pikemate perioodide vältel võib põhjustada neerukahjustust.

5. KUIDAS THROMBO ASS'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida ravimpreparaat välispakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Thrombo ASS'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Thrombo ASS sisaldab

- Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. 1 gastroresistentne tablett sisaldab 75 mg atsetüülsalitsüülhapet.

- Abiained on laktoosmonohüdraat (45 mg), mikrokristalne tselluloos, kolloidne ränidioksiid, veevaba, kartulitärklis, talk, glütserooltriatsetaat, metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) 30 % dispersioon.

Kuidas Thrombo ASS välja näeb ja pakendi sisu

Thrombo ASS 75 mg gastroresistentsed tabletid on valged, ümmargused ja kaksikkumerad tabletid.

PVC/alumiiniumblister.

Pakendis 30 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugu olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c

Tallinn 11312

Eesti

Tel: +3726600945, fax: +3726600946

Infoleht on viimati koostöölstatud augustis 2010